

COLÉOPTÈRES NOUVEAUX DES COLLECTIONS DU MUSÉUM,

PAR M. MAURICE PIC,
CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Les types des espèces décrites ci-après font partie des collections du Muséum national d'Histoire naturelle ⁽¹⁾.

Ptinus (Eutaphrus) Meloui nov. sp. (Fam. *Ptinidae*).

Oblongus, rufus, elytris ad medium piceis, his albido bifasciatis.

Oblong, roux avec les élytres foncés sur leur milieu entre deux fascies blanches transversales. Tête médiocre, densément revêtue de pubescence squamuleuse blanche; antennes peu longues; prothorax pas très large, étranglé près de la base latéralement et peu élargi postérieurement, sans carène lisse basale, assez fortement élevé en dessus au milieu, la gibbosité étant sillonnée et pileuse en arrière, avec sur les côtés une courte dent émoussée et pileuse; élytres assez larges et relativement courts, à stries ponctuées de points forts et intervalles étroits, ornés, avant et après le milieu, de bandes transversales squamuleuses blanches un peu sinuées avec quelques petites macules squamuleuses disposées çà et là, notamment près de la suture, et des rangées régulières de longs poils roux dressés. Pattes grêles.

Long.: 4 millimètres.

Sénégal : Saint-Louis, 1906 (G. Melou).

Voisin de *P. subelongatus* Pic; gibbosité prothoracique moins élevée, pubescence élytrale autrement disposée et antennes plus claires.

Eurygenius attenuatus nov. sp. (Fam. *Pedilidae*).

Parum elongatus, postice valde attenuatus, nigro-subaenescens, antennis pedibusque brunnescentibus.

(1) Dans la collection Pic se trouvent des cotypes de *Hylophilus v. trivittatus*, *Malachius Davidi*, *Caryphurus tonkiniensis* et *C. explanatus*, *Laius Marchei*, *Serandi* et *Harmandi*, dont les descriptions paraîtront ultérieurement.

Peu allongé, très atténué en arrière, noir à reflets bronzés avec les membres brunâtres; orné d'une pubescence grisâtre, peu rapprochée avec de longs poils clairs dressés. Tête ruguleuse, un peu plus étroite que le prothorax; tempes assez courtes, yeux assez gros et très écartés; antennes grêles, peu longues; prothorax court, fortement dilaté, arrondi en avant, irrégulièrement ponctué; écusson grand, tronqué au sommet, pubescent; élytres un peu plus larges que le prothorax, courts, très rétrécis postérieurement, à ponctuation rugulense dense; pattes robustes, assez courtes.

Long.: 5 millimètres.

Madagascar: Province de Morondava et de Tuléar, 1907 (J. Descarpentries).

Paraît voisin de *E. griseopubens* Fm., et semble en différer par la structure du prothorax et par les élytres nettement rétrécis à l'extrémité.

Leptaleus nitidissimus nov. sp. (Fam. Anthicidae).

Elongatus, nitidissimus, nigro-metallicus, antennis pedibusque pro majore parte testaceis.

Allongé, très brillant et peu ponctué, orné antérieurement de quelques longs poils clairs dressés; noir à reflets métalliques avec les membres en majeure partie testacés. Tête assez grosse et longue, obconique en arrière avec une impression occipitale; antennes longues et grêles, rembrunies, à base testacée; prothorax long et étroit, dilaté-arrondi en avant, un peu étranglé en dessous du milieu, à peine élargi en arrière dans sa partie postérieure; élytres pas très larges et assez longs, subarrondis au sommet; pattes longues et grêles, testacées avec le sommet des cuisses et des tibias rembruni.

Long.: 3 millim. 5.

Soudan: Founnia, 1909 (A. Bonhoure).

Espèce très distincte par sa coloration; à placer près de *L. Klugi* Laf.

Anthicus (Stenidius) saigonensis nov. sp. (Fam. Anthicidae).

Elongatus, testaceus, antennis apice, capite thorace pro majore parte elytrisque piceis, his testaceo bifasciatis, fasciis ad suturam junctis.

Allongé, brillant, finement pubescent de gris, testacé avec l'extrémité des antennes, la tête, le prothorax moins la base et les élytres d'un noir de poix, ces derniers ornés de deux bandes obliques testacées qui se joi-

gnent sur la suture. Tête pas très grosse, arquée postérieurement; antennes longues, un peu épaissies et foncées vers l'extrémité; prothorax assez long, dilaté-arrondi en avant, droit sur la base, densément ponctué; élytres allongés, à épaules peu marquées, faiblement déprimés en avant, subarrondis au sommet, modérément ponctués; pattes pas très longues avec les cuisses un peu épaissies.

Long. : 3 millimètres.

Saïgon Cochinchine, novembre 1919 (A. Bonhoure).

Ressemble à *A. vittatus* Luc., tête moins grosse, rétrécie et arquée derrière les yeux, élytres à bandes testacées jointes sur la suture.

***Anthicus Bonhourei* nov. sp. (Fam. Anthicidæ).**

Oblongus, nitidus, rufus, membris testaceis, abdomine, elytris antice et postice testaceo maculatis.

Oblong, brillant, éparsément revêtu d'une courte pubescence grise, roux avec les membres et l'abdomen plus clairs, élytres ornés d'une macule antérieure, éloignée de la suture, et d'une large postérieure mal limitée commune et apicale, celles-ci testacées. Tête large, tronquée-échancrée postérieurement, à ponctuation forte et rapprochée, yeux petits, très éloignés du bord postérieur de la tête; antennes assez courtes et grêles, à peine épaissies à l'extrémité; prothorax peu large et court, dilaté-arrondi en avant, faiblement étranglé près de la base, densément ponctué; élytres larges, courts, atténués à l'extrémité, assez fortement et densément ponctués; pattes courtes et minces.

Long. : 3 millimètres.

Tonkin : Hanoï, juin 1909 (A. Bonhoure).

Ressemble à *A. flavovotatus* Pic, mais antennes à dernier article mince et subovaire, avant-corps un peu brillant et moins densément ponctué. élytres plus robustes, etc.

(*A suivre.*)